

Beiträge zur Dipteren-Fauna Pommerns.

Von **Gustav Schroeder**, Stettin.

I.

Die Insektenfauna der Provinz Pommern ist in fast allen ihren Ordnungen von tüchtigen Entomologen erforscht worden. Nur die zweiflügeligen Insekten (*Diptera*) wurden von den einheimischen Sammlern fast ganz vernachlässigt. Von älteren einheimischen Dipterologen sind mir nur **Triepke** und **Lincke** bekannt. **Triepke**, Superintendent in Garz a. O., sammelte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts neben andern Insekten besonders auch *Dipteren*, und seine Sammlung ist jetzt Eigentum des hiesigen Marienstifts-Gymnasiums. Zu der Sammlung gehört auch ein von **Triepke** im Jahre 1829 angelegtes Artenverzeichnis mit Vaterlandsangaben. Wenn diese Angaben auch nur ganz allgemein gehalten sind, so erfahren wir doch, was **Triepke** in Pommern gefunden hat.

Lincke, Realschullehrer in Stettin, sammelte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Von seiner Sammlung sind mir nur einige Kästen mit *Musciden* — in sehr verfallenen Zustände — zugänglich gewesen. Leider fehlt in der Sammlung jegliche Vaterlandsangabe.

In neuester Zeit hat der leider so früh verstorbene Oberlehrer **Dr. Ketel** in Mecklenburg und in der Umgegend von Stralsund — mit Einschluß der Insel Rügen — gesammelt und das Resultat seiner Beobachtungen in bezug auf eine Familie, die *Syrphiden*, veröffentlicht. (**Ketel**, „Die in Norddeutschland bisher beobachteten Schwebfliegen, *Syrphidae*“, erschienen im III. und IV. Jahresbericht des Progymnasiums in Pasewalk, Ostern 1903 und 1904.)

Zu unsern neueren einheimischen Dipterologen gehört ferner Herr Professor **P. Stein** in Treptow a. R. Es ist

mit Sicherheit zu erwarten, daß dieser ausgezeichnete Entomologe zur Erweiterung der Kenntnis unserer heimischen *Dipteren* beitragen wird.

Ich selbst habe mich erst seit 1903 mit unseren einheimischen Dipteren beschäftigt. Es veranlaßte mich dazu der Wunsch, eine recht fühlbare Lücke in den sonst so umfangreichen und bedeutenden Sammlungen unseres städtischen Museums nach und nach auszufüllen. Meine frühere Gleichgültigkeit gegen das „Fliegengeschmeiß“ ist sehr bald einem lebhaften Interesse gewichen, und das ist nur zu natürlich. Denn kaum eine Insektenordnung bietet dem Beobachter und Sammler eine solche Fülle von Anregung und stiller Freude, als gerade die der Zweiflügler, und ich bedauere heute, daß ich mich nicht schon früher mit dem Studium dieser Tiere befaßt habe.

Wenngleich die Dipterenfauna Pommerns mit derjenigen der Nachbarländer des norddeutschen Tieflandes im allgemeinen übereinstimmen wird, so ist es doch sicher, daß bei der großen Ausdehnung und dem eigenartigen landschaftlichen Charakter einzelner Teile unserer Provinz sich nicht nur neue, sondern auch solche bekannte Arten finden werden, die bisher in Norddeutschland nicht oder doch nur sehr selten beobachtet wurden.

Um nun einen Überblick über die in Pommern vorkommenden Zweiflügler zu gewinnen, möchte ich nachfolgend ein Verzeichnis der hier bisher tatsächlich beobachteten Arten geben, wobei auf die Angaben über Zeit und Ort des Vorkommens der einzelnen Arten besondere Sorgfalt verwendet worden ist.

Die aufgeführten Arten sind in der Hauptsache von mir gesammelt und dem hiesigen städtischen Museum überwiesen worden. Die von mir beim Sammeln besonders bevorzugten Lokalitäten sind:

1. Der Julo, die Buchheide und der Garzer Schrey (Waldfauna);
2. das Oderbruch in der Umgebung der Försterei Bodenbergr und die Wiesen bei Finkenwaide und Lübz in (Sumpf- und Wiesenfauna);
3. die Umgebung des Ostseebades Heidebrink auf der Insel Wollin (Dünenfauna).

Ferner ist das von Herrn E. Schmidt in der Umgebung Stettins — Westendsee, Nemitz, Wolfsschlucht bei Kückenmühle, Oderbruch — gesammelte Material berücksichtigt worden.

Ich lasse nun zunächst ein Verzeichnis der **Syrphiden** folgen.

Fam. Syrphidae.

Subfam. Syrphinae.

Genus Paragus Latr.

bicolor Fabr. 2 ♂♂, 3 ♀♀ von Triepke bei Garz a. O. gefangen.

tibialis Fallen. Am 31. 7. 07 ein Pärchen von E. Schmidt am Westendsee bei Stettin gefangen (gestreift).

Genus Triglyphus Loew.

primus Loew. Am 11. 6. 08 fing ich ein ♀ im Garzer Schrey auf Anthriscus.

Genus Pipizella Rond.

Heringi Zett. Am 31. 5. 08 fing 1 ♀ auf dem Julo auf Blättern. Ketel fing die Art auf Rügen.

virens Fabr. = *annulata* Macq. August-Mai. Auf Dolden und Blättern am Julo selten.

Genus Pipiza Fall.

festiva Meig. Im Juni und Juli auf den Blättern der Gesträuche nicht selten: Julo, Buchheide, Heidebrink.

luctuosa Macq. Am 31. 5. 08 fing ich 1 ♀ am Julo.

lugubris Fabr. = *funebri* Mg. Mai-August. Vereinzelt bei Finkenwalde gefangen.

noctiluca L. Mai bis September. Auf Dolden und Blättern in der Buchheide und auf dem Julo nicht selten.

signata Meig. Am 11. 6. 08 1 ♀ auf dem Garzer Schrey auf Dolden gefangen.

Genus *Orthoneura* Macq.

elegans Meig. Von Triepke bei Garz a. O. 1 ♂ gefangen.

geniculata Meig. Ich fing 1 ♂ am Julo.

nobilis Fallen. Im Juni bis August auf Wiesen bei Nemitz und auf dem Julo ziemlich selten.

Genus *Chrysogaster* Meig.

chalybeata Meig. Juli bis August. Bei Nemitz und Lauenburg i. P.

Macquarti Loew. Im Juni am Julo nicht häufig.

metallina Fbr. Mai-Juli. Glambecksce, Julo.

solstitialis Fall. = *coemeteriorum* L. Im Juni und Juli besonders auf Dolden überall häufig.

splendida Meig. Am 7. 8. 08. 1 ♂ am Julo gefangen.

viduata L. Mai-Juli. Am Julo und auf den Wiesen bei Finkenwalde häufig.

Genus *Chilosia* Meig.

alpipila Meig. Von dieser seltenen Art fand ich im April und Mai auf dem Julo an Weidenkätzchen 4 ♂♂ 1 ♀.

albitarsis Meig. = *viduata* Fbr. Im Mai häufig auf Ranunculus. Julo.

carbonaria Egg. Im Mai bei Bodenbergs auf Ranunculus nicht selten.

chloris Meig. Im April und Mai auf *Caltha palustris* und Ranunculus-Arten häufig. Julo, Bodenbergs.

grossa Fall. Im April und in der 1. Hälfte des Mai an Weidenkätzchen und an steilen, sonnigen Abhängen auf der nackten Erde 3 ♂♂ und 2 ♀♀ gefangen. Julo.

pagana Meig. = *pulchripes* Loew. Im Mai auf dem Julo
3 ♂♂ und 3 ♀♀ gefangen.

ruralis Meig. = *praccox* Zett. Im Mai bei Finkenwalde auf
Caltha palustris.

variabilis Panz. Im Juni auf Dolden. Julo.

vernalis Fall. Im Mai auf dem Julo gefangen.

velutina Loew. Im Mai auf dem Julo gefangen.

impressa Loew. Juni-August. Auf dem Julo häufig.

oestracea L. = *illustrata* Harr. In der Sammlung von
Triepeke 2 ♀♀, angeblich in Pommern gefangen.

intonsa Loew. Ketel fing im Mai 1 ♀ bei Stralsund am
Knieperstrand.

Genus *Platychirus* St. Farg. Serv.

albimanus Fabr. Mai-Juli. Auf dem Julo an Blüten und
Blättern vereinzelt.

discimanus Loew. Mai-Juli. Auf dem Julo mit der vorigen
Art zusammen gefangen.

clypeatus Meig. Im Juni und Juli bei Bodenbergr und
Heidebrink sehr häufig auf Wiesenblumen in der
Nähe von Erlengebüsch gefangen.

fulviventris Macq. Im Juli 1906 4 ♂♂ 3 ♀♀ bei Heidebrink
mit der vorigen Art zusammen gefangen.

immarginatus Zett. Juli-August. Nach Ketel bei Greifs-
wald gefangen.

manicatus Meig. Im Juni und Juli auf dem Julo und bei
Bodenbergr nicht selten.

peltatus Meig. Von Mai bis Juli mit der vorigen Art zu-
sammen gefangen, jedoch seltener.

podagratus Zett. Mai-Juli. Auf dem Julo selten.

scutatus Meig. Im Juli und August auf dem Julo nicht selten.

Genus *Pyrophaena* Schin.

granditarsa Forst = *ocymi* Fbr. Vom Juni bis Sept. auf
den nassen Oderwiesen, besonders auf blühenden

Wasserpflanzen an den Gräben und Kanälen, nicht selten, zuweilen sehr häufig. Auf den Wiesen bei Finkenwalde fand ich unter vielen Stücken dieser Art ein ganz auffällig gezeichnetes ♀. Der Hinterleib ist schwarzbraun; nur am Hinterrande des 2. Segmentes befindet sich ein nicht scharf begrenzter dreieckiger, gelber Fleck. Auf der Unterseite ist die Vorderhälfte des 3., 4., und 5. Segmentes pechbraun, sonst ist der Hinterleib unten gelb.

rosarum Fabr. Im Mai und Juni auf dem Julo und in der Buchheide, aber selten.

Genus Melanostoma Schin.

mellinum L. April-Oktober. Auf Wiesen und in Wäldern an feuchten Stellen überall sehr häufig.

Genus Xanthandrus Verr.

comtus Harr. = *hyalinatus* Fall. Am 21. 7. 05 fand ich ein ♀ am Sandsee.

Genus Leucozona Schin.

lucorum L. Im Mai und Juni. Ich fing diese schöne Art auf dem Julo und in der Buchheide auf Dolden in mehreren Exemplaren. Das ♂ scheint viel seltener zu sein als das ♀.

Genus Ischyrosyrphus Big.

glaucius L. In der Triepkeschen Sammlung befinden sich 2 ♀♀, angeblich aus Pommern.

Genus Didea Macq.

fasciata Macq. Am 27. 7. 05 fand ich 1 ♂ bei Finkenwalde.
intermedia Loew. Mai bis Oktober. Auf Dolden und Kompositen. Am 6. 10. 08 fing ich noch 1 ♂ am Glambecksee auf Hieracium.

Genus Lasiophthicus Rond.

pyrastris L. Juni-Sept. häufig auf Blüten und Blättern.

seleniticus Meig. Juli-Oktober. Ich beobachtete diese Art besonders häufig im September und Anfang Oktober.

Genus Syrphus Fabr.

albostriatus Fall. Im Juli 1903 1 ♀ bei Heidebrink gefangen.

var. **confusus** Egg. Juni-Juli bei Heidebrink und auf dem Julo.

arcuatus Fall. Von Triepke in Pommern gefangen.

auricollis Meig. August. 1 ♂ auf dem Julo gefangen.

balteatus Deg. Juni-Oktober. Überall auf Blüten sehr häufig.

bifasciatus Fabr. Im Mai und Juni häufig auf Blättern und Blüten. Julo, Buchheide.

einctellus Zett. Nach Ketel in Pommern.

corallae Fabr. Juni-August. Julo, Finkenwalde, Buchheide.

luniger Mg. Im Mai 7 Stück auf dem Julo gefangen.

melanostoma Zett. Von Ketel 1 Stück bei Stralsund gefangen.

nitidicollis Meig. Im Mai bei Finkenwalde und Lübzin (3 Stück) gefangen.

ribesii L. Den ganzen Sommer hindurch überall häufig.

torvus Ost.-Sack. = *topiarius* Zett. Im Juni 5 ♂♂, 2 ♀♀ bei Bodenbergs gefangen.

trincinctus Fall. Am 19. 8. 07 fing ich 1 ♂ auf dem Julo.

umbellatarum Fabr. Mai bis August. Julo, Buchheide häufig.

venustus Meig. Im Mai und Juni auf dem Julo und bei Bodenbergs nicht selten. Von der Form *hilaris* Zett. fand ich an denselben Orten 3 Stück.

vitripennis Meig. überall bei uns nicht selten.

Genus Sphaerophoria St. Farg. et Serv.

(*Melithreptus* Loew.)

menthastri L. Juli 1906 fand ich 4 Exemplare bei Heidebrink.

- var. **philanthus** Meig. Juli 1906. 2 Exemplare bei Heidebrink.
melissae Meig. 1 ♂ bei Stettin gefangen.
 var. **picta** Meig. Juli 1906 bei Heidebrink vereinzelt.
 var. **taeniata** Meig. Juli-August bei Heidebrink und Stettin.
scripta L. Mai-August bei Stettin und Heidebrink häufig.
 var. **dispar** Loew. im Juli bei Heidebrink häufig.
 var. **strigata** Staeg. im Juli bei Heidebrink nicht selten.

Genus **Xanthogramma** Schin.

- critrofasciatum** Deg. Mai-Juni. Auf den besonnten Blättern
 niedriger Pflanzen am Rande des Julo vereinzelt
 gefangen.

Genus **Baccha** Fabr.

- elongata** Fabr. Juni-August. In einem Garten in Gollnow
 von Lüderwaldt gefangen. Triepke fing diese Art
 bei Garz a. O.

Genus **Pelecocera** Meig.

- tricincta** Meig. Ich fand diese Art im Juli hinter den Dünen
 bei Heidebrink in Kiefern Schonungen auf Hierarium
 sehr häufig.

Genus **Ascia** Meig.

- dispar** Meig. Mai-Juli auf den Oderwiesen bei Bodenber
 gefangen. Selten.
floralis Meig. Mai-Juli. Auf Wiesenblumen an Wasser-
 gräben bei Finkenwalde und am Julo nicht selten.
quadripunctata Meig. Mit der vorigen zusammen auf Wiesen
 gefangen.
podagrica Fabr. Im Mai auf Wiesenblumen bei Finken-
 walde gefangen.

Genus **Rhingia** Scop.

- campestris** Meig. Juni-Juli. An den Blüten von Geum
 rivale auf dem Julo selten.
rostrata L. Mai-August. Auf dem Julo besonders an Geum

rivale. Diese Art fand ich auch im Juni 1904 sehr häufig an der Dorfstraße in Frauendorf auf *Ballota nigra*. Die rötlichgelbe Farbe des Hinterleibes der beiden *Rhingia*-Arten bildet eine ausgezeichnete Schutzfärbung, so daß die Tiere auf *Geum rivale* nur schwer entdeckt werden können.

Subfam. Volucellinae.

Genus *Volucella* Geoffr.

bombylans L. Juni-August. Auf Blüten, besonders Kompositen, überall nicht selten. Häufig ist die Abart *plumata* Deg., während die Abart *haemorrhoidalis* Zett. selten ist.

pellucens L. Juni-August. Überall sehr häufig.

Subfam. Eristalinae.

Genus *Eristalis* Latr.

aeneus Scop. April-Sept. An Waldrändern, auf Wiesen, an Gräben und steilen Ufern überall häufig.

alpinus Panz. Mai-Juli. Auf Dolden nicht selten. Julio und Buchheide.

arbustorum L. April-Oktober. Auf Blumen überall sehr häufig.

anthophorinus Fall. von Triepke bei Garz gefangen.

cryptarum Fabr. von Triepke bei Garz gefangen.

horticola Deg. Mai-Oktober. Überall sehr häufig.

intricarius L. Mai-August. In der Nähe von Gebüsch und Wäldern häufig auf Blüten und in der Luft schwirrend.

nemorum L. Mai-Juli bei Heidebrink häufig gefangen, bei Stettin seltener, z. B. auf dem Julio.

oestraceus L. = *apiformis* Fall. Ich fand bisher von dieser prächtigen Art nur ein ♀ am 19. 5. 08 auf blühendem Schwarzdorn (*Prunus spinosa*). In der Sammlung von Triepke befinden sich 3 Exemplare aus Pommern.

- pertinax** Scop. Juni-September. Überall ziemlich häufig, besonders auf Dolden.
- pratorum** Mg. Ich fand bisher nur ein ♂.
- rupium** Fbr. Von dieser im Gebirge häufigen Art fand mein Bruder im Juli bei Lauenburg i. P. 1 ♂.
- sepulcralis** L. April-September. Vorkommen wie bei *E. acneus* Scop.
- tenax** L. Mai-Oktober. Überall gemein.

Genus *Helophilus* Meig.

- hybridus** Loew. Juni-August. Auf Kompositen nicht selten. Julo, Bodenberg, Heidebrink.
- pendulus** L. Mai-Oktober. Auf Blättern und Blüten überall gemein.
- trivittatus** Fabr. Juni-August. Auf Blüten, besonders von Kompositen, nicht selten. Julo, Buchheide, Heidebrink.
- frutetorum** Fabr. Juni-Juli. Auf Wiesenblumen und an blühenden Gesträuchen stellenweise sehr häufig, z. B. bei Bodenberg.
- lunulatus** Meig. Mai-Juli. Auf Blüten an Wassergräben. Bei Bodenberg häufig.
- versicolor** Fabr. Juni-Juli. Auf Blüten am Julo nicht selten.
- lineatus** Fabr. Mai- Juli. Auf blühenden Wasserpflanzen bei Bodenberg ziemlich häufig.
- transfugus** L. Juni-Juli. Auf blühenden Wasserpflanzen selten. Bodenberg, Heidebrink.
- floreus** L. Mai-September. Überall häufig.
- nigrotarsatus** Schin. Mai-Juli. Selten. Julo, Heidebrink.

Genus *Mallota* Meig.

- fuciformis** Fabr. In der Sammlung des Marienstifts-Gymnasiums befinden sich 2 Exemplare dieser Art, von Triepke bei Garz gefangen.

cimbiciformis Fall. = *crystalloides* Loew. = *Imatisma posticata* Macq.

Fallen kannte nur das ♂, das nach seiner Angabe im September in Schonen gefangen wurde. Diese Zeitangabe ist wahrscheinlich eine irrtümliche, da die *Mallota*-Arten im Frühlinge fliegen.

Loew beschrieb das ♀ dieser Art; es stammte aus Livland. Gimmerthal hat ein ebenfalls in Livland gefangenes ♀ in der Sammlung der Frau Pastor Lienig in Kokenhaus gesehen.

Schiner fing ein Stück am Kahlenberge.

Macquart beschrieb diese Art als *Imatisma posticata* nach Exemplaren aus Carolina und Philadelphia.

In Norddeutschland ist das Tier nur von Hensel in der Mark gefunden worden. Ich fing von dieser zwar weitverbreiteten, aber sehr seltenen Art im Juni 1908 in der Buchheide 10 ♂♂ und 3 ♀♀ auf Dolden, jedoch nicht an demselben, sondern an verschiedenen Tagen. Es hat übrigens keins der 10 ♂♂ einen Fortsatz in der Mitte der Hinterschienen; dagegen fand Dr. Williston (New Haven, Connecticut) unter amerikanischen Exemplaren dieser Art ♂♂ mit starkem Fortsatz an den Hinterschienen, während dieser Fortsatz bei andern ♂♂ gänzlich fehlte. (Berl. Entomol. Zeitschr. 1883, pag. 171.)

Genus *Merodon* Meig.

equestris Fabr. Am 1. 6. 05 fing ich 1 ♂ auf einer Wiese bei Swinemünde; es ist gleichmäßig gelb behaart. Am Rande der Wiese blühte *Ornithogalum umbellatum* L. in größerer Anzahl. Ich konnte bei meinem kurzen Aufenthalt dort nicht feststellen, ob sich das Insekt in den Zwiebeln dieser Pflanze entwickelt hat.

Am 2. 6. 05 fing ich 1 ♀ auf der Finkenwalder Höhe an *Ranunculus repens* L.. Das Rückenschild

und die beiden ersten Hinterleibssegmente sind schwarz, die letzten gelb behaart. In der Nähe des Fangortes befindet sich eine große Gärtnerei, woselbst das Tier sich entwickelt haben mag.

Subfam. Milesiinae.

Genus *Tropidia* Meig.

scita Harr. = *milesiiformis* Fall. Vom Mai-Juli auf besonnten Blättern am Julo selten, bei Bodenberg häufiger.

Genus *Myolepta* Newm.

luteola Gmel. Ich fand im Juni 1908 6 ♂♂ und 3 ♀♀ in der Buchheide an sonnigen Stellen auf Dolden.

Genus *Criorrhina* Meig.

asilica Fall. Im Mai und Juni auf dem Julo an blühenden Gesträuchen, z. B. *Crataegus* und *Berberis*, nicht selten gefangen.

Genus *Brachypalpus* Macq.

bimaculatus Macq. = *angustus* Egg. Ich fing von dieser sehr seltenen Art am Julo auf *Crataegus* 3, im Garzer Schrey 1 Stück. Mai und Juni.

valgus Panz. Am 14. 5. 06 fing ich ein Stück am Julo auf blühendem *Crataegus*. In der Sammlung von Triepke befindet sich ebenfalls 1 Stück aus Pommern.

Genus *Xylota* Mg.

femorata L. 1 ♂ von Triepke bei Gartz a. O. gefangen.

florum Fabr. Mai-Juli auf besonnten Blättern von Bäumen und Gesträuchen ziemlich selten. Julo, Bodenberg, Heidebrink.

ignava Panz. Mai, Juni. Ebenfalls auf besonnten Blättern. Selten. Buchheide, Julo.

lenta Mg. Mai, Juni. Vorkommen wie bei der vorigen Art.

nemorum Fabr. Mai-August auf besonnten Blättern, nicht häufig. Julo, Bodenbergr, Buchheide.

segnis L. Juni-August. Auf besonnten Blättern, häufig. Julo, Buchheide.

silvarum L. Juni-August. Auf besonnten Blättern und Holzstapeln nicht selten. Julo, Buchheide.

tarda Meig. = *confinis* Zett. Juni-August. Auf besonnten Blättern niedriger Pflanzen bei Heidebrink 12 Stück, auf dem Julo 2 Stück gefangen.

Genus *Syritta* St. Farg. Serv.

pipiens L. Mai-Oktober überall gemein.

Genus *Eumerus* Meig.

annulatus Panz. 1 Stück in der Sammlung des Marienstifts-Gymnasiums von Triepke bei Garz a. O. gefangen.

ruficornis Meig. Von ihr gilt das von der vorigen Art Gesagte.

sabulosum Fall. Juli-August. An durren Orten auf Blüten nicht häufig. Heidebrink.

strigatus Fall. = *lunulatus* Meig. Im Juli und August auf den Oderwiesen und am Westendsee nicht häufig.

Genus *Ferdinandea* Rond.

(*Chrysochlamys* Walker.)

cuprea Scop. VI—VII. Am Julo selten auf Blüten. Auch bei Gollnow von Lüderwaldt gefangen.

nigrifrons Egg. Am 24. 5. 06 am Rande des Julo 1 ♀ gefangen.

Genus *Arctophila* Schiner.

mussitans Fbr. Im Juni auf Crataegus und Kompositen an sonnigen Waldsäumen mehrfach gefangen. Julo, Buchheide.

Genus *Sericomyia* Meig.

lappona L. Im Juni 1907 am Julo und in der Buchheide

auf Blüten und Blättern an sonnigen Stellen mehrfach gefangen.

borealis Fall. mit der vorigen zusammen, aber häufiger.

Genus *Spilomyia* Mg.

saltuum Fabr. Am 4. 8. 05 fand ich 1 ♀ auf den Wiesen bei Finkenwalde auf *Heracleum Sphondylium* L.

Genus *Temnostoma* St. Farg. Serv.

apiforme Fabr. Mai-Juni. Diese Art war bisher aus Norddeutschland nicht bekannt. Ich fand sie nicht selten mit den beiden folgenden Arten zusammen auf blühendem Weißdorn, Doldengewächsen und besonnten Blättern. Julo, Bodenbergl, Buchheide.

bombylans Fabr. Mai und Juni. Viel seltener als die vorige Art, jedoch an denselben Plätzen.

vespiformis L. Mai und Juni. An denselben Orten, aber häufiger.

In der Triepkeschen Sammlung befinden sich zwei von ihm als *vespiformis* L. bezeichnete Stücke; in Wirklichkeit ist nur das eine Stück *vespiformis*, während das andere *apiformis* Fabr. ist.

Genus *Calliprobola* Rond.

speciosa Rossi. In der Triepkeschen Sammlung befinden sich 2 Exemplare, welche Triepke wahrscheinlich im Garzer Schrey gefangen hat. Sonst ist diese Art in Pommern noch nicht beobachtet worden.

Subfam. *Chrysotoxinae*.

Genus *Chrysotoxum* Meig.

arcuatum L. von Triepke in Pommern gefangen.

bicinctum L. Juni-August. An sonnigen Waldsäumen auf Blättern und Dolden nicht selten. Julo, Buchheide.

cautum Harr. = *silvarum* Mg. Mai-Juni. Ich fing diese schöne Art ebenfalls nicht selten am Rande des Julo.

- festivum** L. Mai-Juli. An denselben Orten wie die vorige Art, ziemlich häufig. Julo, Buchheide.
- octomaculatum** Curt. Mai-Juni. 3 Stück auf dem Julo gefunden. Von Lüderwaldt auch bei Gollnow gefangen.
- vernale** Loew. Mai-Juni. Ich fing sie nicht selten mit *festivum* zusammen auf dem Julo.

Subfam. Microdontinae.

Genus Microdon Meig.

- devius** L. 13. 6. 96 zwei Exemplare beim Bahnhof Speck am Gubenbach von Lüderwaldt gefangen.

Subfam. Ceriinae.

Genus Cerioides Rond.

(*Ceria* Fbr.)

- conopsoides** L. In seinem Dipteren-Verzeichnis zählt Triepke dieses Tier als in Pommern gefangen auf und zwar das ♀. In seiner Sammlung ist es nicht vorhanden. Ich habe diese seltene Art bisher noch nicht beobachtet.
-